

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift
AMBULATORY PHLEBECTOMY

KEES-PETER DE ROOS

1. De ambulante flebectomie is een veilige behandelingsmodaliteit voor (voet)varices. (dit proefschrift)
2. Indien het scleroseren van zijtakvaricose na twee pogingen niet succesvol is, dient men te kiezen voor een andere behandeling. Ambulante flebectomie is dan een goede keuze. (dit proefschrift)
3. De wijze van compressietherapie na varices behandeling is niet standaard. (dit proefschrift)
4. Ambulante flebectomie is een effectieve en efficiënte manier om veneus materiaal te oogsten voor histologisch onderzoek. (dit proefschrift)
5. Het ontstaan van hematoom na ambulante flebectomie is inherent aan deze techniek en geen zeldzame complicatie. (dit proefschrift)
6. De diagnostische excisie van een maligne melanoom is een dermate routine ingreep voor de dermatoloog dat deze zo snel mogelijk, bij voorkeur dezelfde dag, verricht dient te worden.
7. Nadat wetenschappelijk is aangetoond dat elastische kousen van compressie-klasse II driemaal per jaar vervangen dienen te worden (Veraart, 1997), zijn overheid en zorgverzekeraar overgegaan deze slechts éénmaal per zeven maanden te vergoeden. De door diezelfde overheid gepropageerde 'Evidence based medicine' wordt daarmee een slechte dienst bewezen.
8. Iedere fleboloog dient tenminste gedurende één zomer dagelijks elastisch therapeutische kousen te dragen. Voor zorgverzekeraars zou dat eveneens geen slechte zaak zijn.
9. "De mens beter maken" is voor meer dan één klemtoon vatbaar; in dat licht zou vooral de pre-conceptionele periode meer aandacht verdienen.
10. Niet iedere promotor is ook pro motor.
11. Boeken over diarree moeten dun zijn. (Bart J.H. de Roos, 2003)